



## BEZAFIBRATO

Dislipidemia para prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite  
Portaria Conjunta nº 8, de 30 de julho de 2019 ([Protocolo na íntegra](#))

### Informações gerais

**Dosagem/ Apresentação:** 200 mg – drágea ou comprimido e 400 mg – comprimido de desintegração lenta

**CIDs contemplados:** E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4, E78.5, E78.6, E78.8

**Quantidade máxima mensal:**

**Para dispensação:** 200 mg – 62 comprimidos / 400 mg – 31 comprimidos.

**Para faturamento (SIGTAP):** 200 mg – 62 comprimidos / 400 mg – 31 comprimidos.

**Grupo de financiamento:** 2 - Aquisição pelo Estado do Amazonas.

**Observações:** -

### Documentos necessários para solicitação do medicamento

#### 1ª Solicitação

1. [Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica](#) original, preenchido de forma completa e legível pelo médico responsável pelo atendimento ao paciente.  
ATENÇÃO: O LME terá 90 (noventa) dias de validade para solicitação do medicamento, a partir da data de seu preenchimento pelo médico solicitante.
2. Prescrição de medicamento original, em duas vias, elaborada de forma completa e legível, pelo médico responsável pelo atendimento ao paciente.
3. Cópia de documentos pessoais do paciente:
  - Documento de identidade e CPF;

- Comprovante de residência com CEP;

- Cartão Nacional de Saúde (CNS).

#### 4. Cópia dos exames:

- Descrição, no campo "anamnese" do LME (Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica) do fator de risco cardiovascular apresentado pelo paciente:
  - o Diabetes melito;
  - o Risco cardiovascular definido pelo Escore de Risco de Framingham;
  - o Evidência clínica de doença aterosclerótica.
- Dosagem sérica – AST/TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética);
- Dosagem sérica – ALT/TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica);
- Dosagem sérica – CPK (creatinofosfoquinase);
- Dosagem sérica – TSH (Hormônio Tiroestimulante);
- Dosagem sérica – colesterol total;
- Dosagem sérica – HDL (High-density lipoprotein);
- Dosagem sérica – triglicerídeos;
- Dosagem sérica – LDL **ou** cálculo do LDL pela equação de Friedewald;

Equação de Friedewald:  $LDL = [(Colesterol\ total) - HDL] - (Triglicerídeos/5)$

ATENÇÃO: Não é necessário apresentar Termo de Esclarecimento e Responsabilidade.

## Renovação da Continuidade

1. [Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica](#) original, preenchido de forma completa e legível pelo médico responsável pelo atendimento ao paciente (semestralmente).

ATENÇÃO: O LME terá 90 (noventa) dias de validade para solicitação do medicamento, a partir da data de seu preenchimento pelo médico solicitante.

2. Prescrição de medicamento original, em duas vias, elaborada de forma completa e legível, pelo médico responsável pelo atendimento ao paciente (semestralmente).

3. Cópia de documentos pessoais do paciente:

- Comprovante de residência com CEP;

4. Cópia dos exames:

Semestralmente ou a cada alteração de dose:

- Dosagem sérica – AST/TGO (Transaminase Oxalacética);
- Dosagem sérica – ALT/TGP (Transaminase Pirúvica);
- Dosagem sérica – CPK (creatinofosfoquinase);
- Dosagem sérica – triglicerídeos.

Anualmente:

- Dosagem sérica – perfil lipídico (colesterol total, HDL, LDL, triglicerídeos).